

De : D' Prosanto Chaudhury
À : Coordonnateurs-conseillers cliniques
Date d'entrée en vigueur : 2024-04-24
Renvoi : ATT-PON-104 Attribution rénale
Objet : **Critères d'exclusion spécifiques et retrait de la limite de poids minimal chez les donneurs potentiels pédiatriques**

Veillez prendre note que...

1. Deux nouveaux points s'insèrent entre les points 6.4.2.2 et 6.4.3 et rédigés comme suit :
 - 1.1 Critères spécifiques relatifs à l'âge du donneur potentiel
 - 1.1.1 Don après décès par critères circulatoires (DCC)
 - 1.1.1.1 Si âgé de 65 ans et plus (≥ 65 ans) et a un débit de filtration glomérulaire inférieur à 60 ml/min/1.73 m² (DFGe < 60), ne pas offrir les reins.
 - 1.1.1.2 Si âgé de 75 ans et plus (≥ 75 ans), ne pas offrir les reins.
 - 1.1.2 Don après décès par critères circulatoires (DCC) suite à l'aide médicale à mourir (AMM)
 - 1.1.2.1 Si âgé de 65 ans et plus (≥ 65 ans) et a un débit de filtration glomérulaire inférieur à 60 ml/min/1.73 m² (DFGe < 60), ne pas offrir les reins.
 - 1.1.2.2 Si âgé de 80 ans et plus (≥ 80 ans), ne pas offrir les reins.
 - 1.1.3 Don après décès par critères neurologiques (DCN)
 - 1.1.3.1 Si âgé de 70 ans et plus (≥ 70 ans) et a un débit de filtration glomérulaire inférieur à 50 ml/min/1.73 m² (DFGe < 50), ne pas offrir les reins.
 - 1.1.3.2 Si âgé de 85 ans et plus (≥ 85 ans), ne pas offrir les reins.
 - 1.2 Critères spécifiques relatifs à l'histoire médicale
 - 1.2.1 Un donneur potentiel est exclu d'emblée comme donneur rénal si celui-ci présente l'une des conditions suivantes :
 - 1.2.1.1 Atteinte rénale :
 - Dialyse chronique.
 - 1.2.1.2 Cancer
 - 1.2.1.2.1 Cancer actif ou antécédent de cancer avec traitement de chimiothérapie ou radiothérapie au cours des cinq (5) dernières années.
 - 1.2.1.2.1.1 L'exclusion ne s'applique pas pour les cancers de la peau.
 - 1.2.1.2.1.2 L'exclusion ne s'applique pas pour les cancers de la prostate si :
 - Absence de métastases et;
 - Gleason 6 avec PSA < 10 sous surveillance active ou;
 - Gleason ≤ 7 avec PSA < 2 traité par radiothérapie ou;
 - Gleason 7 avec PSA indétectable suite à prostatectomie.
 - 1.2.1.2.2 Antécédent de tumeur cérébrale primaire : Glioblastome grade III ou IV ayant eu une biopsie ou une réduction tumorale.

1.2.1.3 Infections, maladies transmissibles ou facteurs de risque :

- Résultat positif à une des analyses de sérologie ou virologie suivantes : Ag HBs, HTLV-I, HTLV-II ou TAN VNO.
- Diagnostic de la rage ou morsure d'un animal porteur de la rage au cours des six (6) derniers mois.
- Endocardite avec abcès et/ou embolie septique rénal démontré par imagerie.
- Encéphalite ou méningite active d'étiologie inconnue.
- Tuberculose active disséminée.
- Fièvre hémorragique d'étiologie virale, incluant l'Ebola ou l'exposition à une personne atteinte d'Ebola.
- Septicémie sévère non traitée ou d'étiologie indéterminée.
- Fongémie active.
- Perforation intestinale.

2. Le point 6.4.3.6 ne s'applique plus.



Dr Prosanto Chaudhury, Directeur médical – transplantation d'organes